

イムセラを  
処方された患者さん、  
ご家族のみなさまへ

「安全性  
チェックリスト」  
「イムセラカード」  
つき



【監修】福島県立医科大学医学部 多発性硬化症治療学講座  
教授 藤原 一男 先生

このお薬は、田辺三菱製薬株式会社とノバルティス ファーマ株式会社から、  
それぞれ「イムセラ®」、「ジレニア®」の名前で販売されています。

# 多発性硬化症治療薬イムセラはこんな

**イムセラは、**  
多発性硬化症(MS)の  
再発を防いで  
障害の進行を抑える、  
**飲み薬(カプセル)タイプ**の  
お薬です。



## Q 期待される効果は？

イムセラは、MSの再発を防いで、障害の進行を抑えます。

## Q イムセラの服用方法は？

- イムセラは、**毎日(1日1回)1カプセル**ずつ、水やぬるま湯で服用してください。
- イムセラは、**できるだけ同じ時間に服用**してください。

## Q 飲み忘れたら？

- イムセラを飲み忘れた場合、次の服用時に心拍数低下や心伝導の異常が起きやすくなります。
- **飲み忘れがないよう十分に注意**してください。
- 飲み忘れた場合は、**医師・薬剤師に相談**してください。

## Q イムセラの保管場所は？

- 乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気、凍結を避けて**25℃以下で保管**してください。

(夏場は車の中などの高温になる場所には置かないでください。冷蔵庫など、凍結する場所で保管しないでください)




## Q イムセラはどうやって効くの？

イムセラの働きを知る前に、まずはMSと「リンパ球」（白血球の一種）の関係について知っておきましょう。

リンパ球  
の動きに  
注目！

### 多発性硬化症 (MS)



MSは、中枢神経(脳・脊髄)の軸索を覆っている「**ミエリン**」が破壊(**脱髄**)されることで、様々な症状があらわれる病気です。MSの発症には、図のように**リンパ球**が大きく関わっているといわれています。

- ①まず、体内のリンパ節で待機していたリンパ球が**血液中に移動**します。
- ②リンパ球は血液の流れに乗って、中枢に入ります。
- ③中枢に入ったリンパ球が免疫系に異常を起こして、**ミエリンを破壊(脱髄)**します。


### 用語解説

- **リンパ球**：白血球の一種で、“免疫反応”を担当する細胞。
- **軸索**：神経の情報伝える“電線”のようなもの。

飲み薬タイプ

多発性硬化症治療薬イムセラはこんなお薬です

イムセラ服用後



イムセラを服用すると…

- ① イムセラはリンパ節内で、リンパ球の表面にある「S1P<sub>1</sub>受容体」と結合します。すると、リンパ球は血液中に移動できなくなります。
- ② その結果、中枢にも入ることがなくなるため、脱髄が抑えられるのです。

イムセラは、脱髄に関わっている  
「リンパ球」をリンパ節内にとどめておく  
お薬です

- **ミエリン**：軸索を覆う“電線のカバー”のようなもの。ミエリンが破壊（脱髄）されると、軸索がむき出しになり、情報がうまく伝わらなくなる。

# イムセラ服用中に注意していただきたい

イムセラの服用中にみられる「重要な副作用」について紹介します。副作用は早期に発見し、早めに適切な治療を行うことで、重症化を防ぐことができます。そのため、**重要な副作用についてあらかじめ知っておき、少しでも異常を感じたら、すぐに主治医に相談してください。**

## ● じょ みゃく 徐脈性不整脈について

イムセラを初めて服用する日は心拍数が低下しやすく、それに関連した症状（めまい、ふらつきなど）があらわれることがあります。



- イムセラを初めて服用した後は、**24時間、医療機関で心拍数や血圧などを観察**することが推奨されています。また、服用前と6時間後などに心電図検査が必要とされています。なお、心電図検査については、先生の指示に従ってください。入院が必要になる場合もあります。
- また、**勝手に帰宅せず**、必ず主治医の指示のもと対応してください。
- 服用開始1ヵ月後までは、自動車の運転など危険を伴う機械の作業をする際は注意してください。
- 帰宅後も何か異常を感じたら、すぐに主治医に連絡してください。
- イムセラの**服用を中止していた後に服用を再開する場合**も、初めての服用時と同様、24時間は医療機関で心拍数や血圧などの観察、および心電図の検査が必要となる場合があります。
- 以下の不整脈のお薬を、イムセラと一緒に服用してはいけません。
  - ・クラスIa抗不整脈剤（キニジン、プロカインアミドなど）
  - ・クラスIII抗不整脈剤（アミオダロン、ソタロールなど）
- その他、心臓系の疾患やそれに対する治療薬がある場合は、主治医に相談してください。

## ●感染症について

イムセラの服用中は血液中のリンパ球数が減少し、細菌やウイルスなどによる感染症にかかりやすくなっています。

- リンパ球の状態を知っておくためにも、イムセラの服用中は、主治医の指示のもと**定期的に血液検査を受けてください**。
- 海外の臨床試験で重篤な感染症により死亡に至った症例が報告されているため、イムセラの服用中および服用中止後2ヵ月間は感染症に注意し、**風邪などの感染症の症状があらわれたら、すぐに主治医に連絡**してください。  
(発熱、咳・くしゃみ、体がだるい、寒気、喉が痛い、鼻水・鼻づまり など)
- 帯状疱疹**<sup>たいじょうほうしん</sup>が疑われる**症状があらわれたら、すぐに主治医に連絡**してください。  
(赤い発疹、ピリピリした痛み など)
- 進行性多巣性白質脳症 (PML)**<sup>たいしんせい たそうせい ぱくしつ ねうせい</sup>が疑われる**症状があらわれたら、すぐに主治医に連絡**してください。  
(意識がなくなる、考えがまとまらない、物忘れ、手足のまひ、しゃべりにくい、見えにくい など)
- ワクチン接種を希望される場合は、主治医に相談してください。



## ● 眼の病気 (黄斑浮腫<sup>おうはんふしゅ</sup>\*) について

イムセラの服用初期に、眼の病気である黄斑浮腫があらわれることがあります。

★：黄斑浮腫とは、眼の奥にある網膜の中心部の「黄斑」という場所が腫れた状態をいいます。黄斑浮腫になると、霧がかって見えたり、視力が低下するなどの症状がみられますが、症状がない場合も多くあります。



- 黄斑浮腫の初期は症状がない場合が多いため、早期発見のためにも、イムセラの服用開始3~4ヵ月後には、主治医の指示のもと必ず眼科を受診し、眼科検査を受けてください。
- 眼の症状があらわれた場合は、すぐに主治医に連絡してください。





## イムセラ服用中に注意していただきたいこと



### ●肝臓の機能について

イムセラの服用中、肝臓の機能（肝機能）に異常があらわれることがあります。

- 肝機能障害の早期発見のためにも、イムセラの服用中は、主治医の指示のもと**定期的に肝機能検査を受けてください**。
- 肝機能障害によるものと思われる次のような症状があらわれた場合は、すぐに肝機能検査を受けてください。（吐き気がする／吐く、お腹が痛い、体がだるい、食欲がない、体や白目の部分が黄色っぽい（黄疸）、尿の色が濃い（暗色尿）など）

### その他の注意事項 妊娠について（女性の方へ）

- 妊婦または妊娠している可能性のある方は、イムセラを服用できません。
- イムセラの**服用中および服用中止後2ヵ月間**は、胎児に及ぼすリスク（危険）を避けるために**必ず避妊**してください。授乳も避けてください。
- イムセラの服用中に妊娠が確認された場合は、すぐにイムセラの服用を中止する必要があります。



# 『安全性チェックリスト』で あなたの状態を常にチェックしましょう！

イムセラの服用中は、**ご自身の状態を常にチェック**  することが大切です。  
 が付いた項目があれば、すぐに主治医に連絡してください。

## 安全性チェックリスト

### 徐脈性不整脈について

- めまい・ふらつきがある     疲れやすい     どうき 動悸がする  
 医療機関で不整脈のお薬を処方された

### 感染症について★1

- 風邪などの感染症の症状がある  
(発熱、咳・くしゃみ、体がだるい、寒気、喉が痛い、鼻水・鼻づまり など)  
 帯状疱疹たいじょうほうしんが疑われる症状がある  
(赤い発疹、ピリピリした痛み など)  
 進行性多巣性白質脳症 (PML) たそうはくしつが疑われる症状がある  
(意識がなくなる、考えがまとまらない、物忘れ、手足のまひ、しゃべりにくい、見えにくい など)  
 ワクチン接種を希望している

★1：上記のような症状がなくても、イムセラの服用中は、主治医の指示のもと  
定期的に血液検査を受けてください。

### 眼の病気 (黄斑浮腫) について★2

- 霧がかって見える     視力が低下した などの眼の症状がある  
★2：上記のような症状がなくても、イムセラの服用開始3〜4カ月後には、  
主治医の指示のもと必ず眼科を受診し、眼科検査を受けてください。

### 肝臓の機能について★3

- 吐き気がする／吐く     お腹が痛い     体がだるい  
 食欲がない     体や白目の部分が黄色っぽい (黄疸)  
 尿の色が濃い (暗色尿)

★3：上記のような症状がなくても、イムセラの服用中は、主治医の指示のもと  
定期的に肝機能検査を受けてください。

### 妊娠について (女性の方へ)

- 妊娠した／妊娠した可能性がある     妊娠したい

本チェックリストの結果は、必ず担当医にお見せください！

# 『イムセラカード』は 必ず携帯してください!

医療機関(病院、薬局など)を受診される際は、  
医師・薬剤師の先生に、『イムセラカード』を必ず見せてください。  
(これにより、現在あなたがイムセラを服用していることを先生に理解してもらえます)

## イムセラカード

本カードは必ず携帯してください

**かかりつけの医療機関 連絡先**

医療機関名: \_\_\_\_\_  
担当医師名: \_\_\_\_\_  
電話番号: \_\_\_\_\_

**患者さん 連絡先**

お名前: \_\_\_\_\_  
電話番号: \_\_\_\_\_

イムセラの安全性情報はWebでご覧いただけます  
<https://imu-navi.net>

 田辺三菱製薬株式会社  
大塚製薬株式会社(医薬品)の子会社  
くすり相談センター ☎0120-753-260 受付時間 月-金 9:00-17:30  
<https://www.mtb-pharma.co.jp>

▲左下よりゆっくり剥がしてください

『イムセラカード』を剥がしたら、  
お薬手帳やご自身の手帳、  
またはお財布などにはさむなどして、  
**必ず携帯してください!**



イムセラに関する情報は、Webでもご覧いただけます

<https://imu-navi.net>

不明な点やわからないこと、さらに詳しく知りたいことなどがありましたら、  
遠慮なく医師・薬剤師の先生にお尋ねください。

医療機関名



田辺三菱製薬株式会社  
大阪市中央区道修町3-2-10